

## Тесты для промежуточной аттестации

студентов лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов, факультета иностранных студентов, интернов

Квалификационные тесты включают в себя вопросы по сестринскому делу, неотложной помощи и реанимации, медицине катастроф и оказанию помощи детскому населению. Содержание тестов соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

**Для зачета необходимо набрать 100% правильных ответов!**

*Выберите один правильный ответ*

### 1. Колибактерин предназначен для введения

- а) внутривенного
- б) подкожного
- в) перорального
- г) внутримышечного

### 2. Вакцину БЦЖ с целью иммунизации вводят

- а) внутримышечно
- б) внутримышечно или подкожно
- в) строго подкожно
- г) строго внутрикожно

### 3. В раннем послеоперационном периоде после полостной гинекологической операции задача медицинской сестры

- а) напоить больную горячим сладким чаем
- б) накормить больную
- в) следить за гемодинамикой и состоянием послеоперационного шва
- г) дать обезболивающие таблетки, по просьбе больной

### 4. Больного после спинномозговой пункции необходимо уложить

- а) на живот без подушки
- б) на спину с приподнятым головным концом
- в) на бок с приведенными к животу коленями
- г) полусидя

### 5. Кристаллоидные растворы перед внутривенным введением

- а) подогревают до комнатной температуры
- б) подогревают до 50<sup>0</sup>
- в) подогревают до 37-38<sup>0</sup>
- г) вводят холодными в случае гипертермии

### 6. Больному брюшным тифом при задержке стула показано

- а) пища с обилием клетчатки
- б) солевые слабительные
- в) массаж живота
- г) небольшая очистительная клизма

### 7. Укушенные раны, нанесенные животными (возможными источниками бешенства), необходимо

- а) обработать йодом
- б) промыть перекисью водорода
- в) промыть раствором фурацилина
- г) промыть мыльным раствором

**8. Метод А.М. Безредко предусматривает**

- а) прием суточной дозы лекарств на фоне антигистаминных препаратов
- б) введение препаратов в минимальных дозировках
- в) введение вначале небольшой дозы препарата, а при отсутствии реакции – полной дозы
- г) введение суточной дозы препаратов с максимально большими интервалами

**9. Максимальный объем препаратов, вводимый внутримышечно в одно место, не превышает**

- а) 5 мл
- б) 10 мл
- в) 15 мл
- г) 20 мл

**10. Наблюдение за пациентом после постановки пробы на переносимость антибиотиков продолжается**

- а) в течение 2-3 минут
- б) в течение 5-10 минут
- в) до 30 минут
- г) не менее 2 часов

**11. Неотложная помощь при анафилактическом шоке начинает оказываться**

- а) в процедурном кабинете
- б) в отделении реанимации
- в) в палате интенсивной терапии
- г) на месте развития

**12. При анафилактическом шоке, вызванном внутривенным капельным введением лекарств, главным является**

- а) снять капельницу
- б) перекрыть капельницу, сохранив доступ в вену
- в) создание психического покоя
- г) пероральный прием антигистаминных препаратов

**13. Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается к**

- а) углу нижней челюсти
- б) поперечному отростку 7-го шейного позвонка
- в) к ключице
- г) к грудино-ключично-сосцевидной мышце

**14. При применении сердечных гликозидов следует следить за:**

- а) температурой тела
- б) частотой пульса
- в) цветом мочи
- г) сном

**15. Струйно можно вводить**

- а) компоненты крови
- б) реополиглюкин
- в) гемодез
- г) трисоль

**16. Ферментативные препараты (мезим, фестал) принимают**

- а) независимо от приема пищи
- б) строго натощак
- в) во время еды
- г) спустя 2-3 часа после еды

- 17. Резкое падение температуры, тахикардия, бледность кожных покровов при брюшном тифе могут свидетельствовать о**
- а) начале выздоровления
  - б) кишечном кровотечении
  - в) сниженном иммунитете
  - г) гиповитаминозе
- 18. Резкий запах озона в воздухе после кварцевания свидетельствует о**
- а) надежном обеззараживании воздуха
  - б) создании благоприятной атмосферы для человека
  - в) недостаточном времени для обеззараживания воздуха
  - г) необходимости проветривания помещения и плохой работе бактерицидной лампы
- 19. Органы дыхания необязательно защищать маской при**
- а) взятии крови из вены
  - б) взятии мазка из зева и носа
  - в) уходе за больным холерой
  - г) приготовлении растворов хлорамина
- 20. С целью улучшения кровообращения при бронхолегочных заболеваниях детям противопоказано**
- а) ставить горчичники
  - б) ставить банки
  - в) делать массаж
  - г) делать согревающий компресс
- 21. Ветошь для генеральной уборки операционной должна быть**
- а) любой
  - б) чистой
  - в) продезинфицированной
  - г) стерильной
- 22. Инсулин хранят**
- а) при комнатной температуре
  - б) при температуре  $+1 - +10^{\circ}\text{C}$
  - в) при  $-1 - +1^{\circ}\text{C}$
  - г) в замороженном виде
- 23. Вид транспортировки определяет**
- а) медицинская сестра в соответствии с состоянием больного
  - б) медицинская сестра в соответствии с самочувствием больного
  - в) врач в соответствии с самочувствием больного
  - г) врач в соответствии с состоянием больного
- 24. При транспортировке больного в кресле-качалке представляет опасность нахождение рук**
- а) на животе
  - б) в скрещенном положении
  - в) на подлокотниках
  - г) за пределами подлокотников
- 25. При критическом падении температуры не следует**
- а) сообщать о случившемся врачу
  - б) убирать подушку из-под головы и приподнимать ноги пациента
  - в) оставлять одного пациента для создания максимального покоя
  - г) давать пациенту горячий чай

- 26. Техника безопасности при хранении баллонов с кислородом предусматривает все, кроме**
- а) запрета курения в помещении, где хранятся баллоны
  - б) хранения баллонов вблизи источников тепла
  - в) хранения баллонов в хорошо вентилируемом помещении
  - г) соприкосновения кислорода с жирами и маслами
- 27. Взятие материала на бактериологический посев из прямой кишки запрещено проводить**
- а) резиновым катетером
  - б) ректальной петлей
  - в) ректальным тампоном
  - г) ректальной стеклянной трубкой
- 28. Основной признак одышки у ребенка:**
- а) бледность кожных покровов
  - б) раздувание и напряжение крыльев носа
  - в) выбухание родничков
  - г) громкий плач
- 29. После сублингвального приема клофелина при гипертоническом кризе пациент должен оставаться в положении лежа не менее**
- а) 10-15 минут
  - б) 20-30 минут
  - в) 1,5-2 часов
  - г) 12 часов
- 30. При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие**
- а) эмболии
  - б) флегмоны
  - в) кровотечения
  - г) спазма сосуда
- 31. При внутримышечном введении аминазина больному необходимо**
- а) находиться в положении лежа 1,5-2 часа
  - б) принять антигистаминные препараты
  - в) положить грелку на место инъекции
  - г) принять пищу
- 32. При появлении ярких кровавистых выделений из влагалища у беременной при сроке 10 недель необходимо**
- а) направить беременную к врачу женской консультации
  - б) срочно отправить беременную в стационар любым попутным транспортом
  - в) вызвать скорую помощь
  - г) уложить беременную дома в постель и ввести кровоостанавливающие препараты
- 33. Защитой от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, являются**
- а) презервативы
  - б) внутриматочные спирали
  - в) гормональные контрацептивы
  - г) местные контрацептивы
- 34. В первые сутки после родов подмывать роженицу следует**
- а) на гинекологическом кресле
  - б) на кушетке в процедурном кабинете
  - в) в постели
  - г) в туалетной комнате, обучив ее самостоятельно выполнять процедуру

**35. Взятие мазков из влагалища медицинская сестра производит**

- а) стерильными инструментами в стерильных перчатках
- б) стерильными инструментами без перчаток
- в) стерильными инструментами в чистых перчатках
- г) продезинфицированными инструментами в стерильных перчатках

**36. Измерения АД у беременной с тяжелой формой гестоза медсестра производит**

- а) в процедурном кабинете, в положении пациентки лежа
- б) на посту, в положении пациентки сидя
- в) в постели, в положении пациентки лежа
- г) в палате, в положении пациентки сидя