

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Сахипова Д.Р. «Дифференцированная тактика при хирургическом лечении больных с диффузным токсическим зобом», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия

Одним из нерешенных вопросов эндокринной хирургии является проблема подхода к объему хирургического лечения больных диффузно-токсическим зобом. На современном этапе существуют два направления, основывающиеся на возможности оставления паренхимы щитовидной железы, либо ее полного удаления. Отличия хирургических тактик определены сохраняющимся уровнем послеоперационных осложнений и возникновения рецидива заболевания.

В связи с этим актуальной проблемой является изучение возможности дифференцированного подхода при хирургическом лечении больных с диффузным токсическим зобом.

Сформулирована цель исследования – улучшить результаты хирургического лечения больных с диффузным токсическим зобом посредством разработки и внедрения индивидуализированного подхода к определению объема операции на щитовидной железе. Задачи плавно вытекают из поставленной цели.

Основой клинической части диссертации является сравнительный анализ исследований результатов лечения 249 пациентов с диффузным токсическим зобом, у которых оценивали развитие специфических осложнений. В ходе ретроспективного этапа исследования определены факторы риска развития рецидива заболевания. Проспективное исследование проведено с учетом индивидуализированного подхода при решении вопроса об объеме операции.

Все полученные данные обработаны статистически. Обработка результатов исследования проводилась с учетом современных требований доказательной медицины.

Научная новизна. Определена значимость факторов риска развития рецидива после выполнения операции субтотальной резекции щитовидной железы. На основе полученных данных разработан оригинальный способ дооперационного определения объема операции у больных диффузным токсическим зобом. Дано обоснование возможности выполнения операции субтотальной резекции щитовидной железы с минимальной возможностью риска развития рецидива заболевания.

Практическая значимость работы. Разработанный способ, основанный на интерпретации значений тиреостимулирующих антител, позволяет выбрать необходимый объем операции на щитовидной железе в предоперационном периоде. Внедрение разработанного алгоритма в клиническую практику позволило снизить частоту неудовлетворительных результатов и привело к отказу от

- 2 -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование Сахипова Д.Р. «Дифференцированная тактика при хирургическом лечении больных с диффузным токсическим зобом» соответствует критериям п.9, п.10. раздела II "Положения о присуждении ученых степеней", утвержденного постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013, а сам автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.

Ф, 

660022, г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1
телефон: +7 (391) 212 51 80
e-mail: sur-com@yandex.ru