

Отзыв на автореферат диссертации

Капраловой Ирины Юрьевны на тему: «Взаимосвязь адипокинов и гормонально-метаболических показателей у больных гипотиреозом», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 – Эндокринология

Гипотиреоз является одной из часто встречающихся эндокринных патологий. Распространенность этого заболевания среди взрослых составляет 1-2%, а частота субклинической формы достигает 10%. Длительный дефицит тиреоидных гормонов приводит к функциональным и органическим нарушениям сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной, пищеварительной и других систем. Гипотиреоз является значимым фактором риска развития дислипидемии и атеросклероза, однако роль гормонов жировой ткани в этом патологическом процессе изучена недостаточно, что делает тему диссертационной работы Капраловой И.Ю. современной и актуальной.

Цель и задачи исследования сформулированы четко, грамотно. В соответствии с целью и задачами разработан дизайн исследования.

Автором изучены взаимосвязи гормонов жировой ткани (лептина, резистина, адипонектина) и витамина Д3 с метаболическими показателями и ремоделированием миокарда у больных гипотиреозом.

Диссертационная работа базируется на достаточном научном материале. Автором были обследованы 106 женщин с первичным гипотиреозом и 20 человек составили контрольную группу. В исследовании использованы современные методы обследования пациентов (исследование иммунореактивного инсулина, лептина, резистина, адипонектина, витамина Д3 в сыворотке крови, расчет индекса инсулинорезистентности, эхокардиографическое обследование и УЗДГ сонных артерий).

В автореферате подробно представлены данные о состоянии углеводного и липидного обмена у обследованных лиц, гормонально-метаболические параметры и эхокардиографические показатели. Разработанный алгоритм обследования больных гипотиреозом позволяет прогнозировать развитие атеросклероза и ремоделирования миокарда.

Результаты, полученные автором, позволяют сделать вывод, что повышенный уровень лептина и резистина и снижение концентрации адипонектина и витамина Д3 в сыворотке крови у женщин с гипотиреозом играет определенную роль в развитии атеросклероза. При этом компенсация заболевания не приводит к нормализации липидного профиля.

Критических замечаний нет.

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» моих персональных данных (в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 01.06.2015 г. № 662), необходимых для работы диссертационного совета Д 208.085.05.

учебной
ной работе,
ы эндокринологии,
улица Советская, дом 4.

170100, г. Тверь, улица Советская, дом 4.
тел. (4822) 35-98-70
education@tvergmu.ru

Подпись Д.В. Кисельников
Нач. управления кадров Лосев
31.03.2017 Е.В. Потапова